

used in assessment of
a loss and giddiness



ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಮಿದುಳು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ದಿನ ■ ಮಗುವಿನ ಅಸಹಜ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ

ಮಿದುಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ: ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯೇ ಮದ್ದು

ವಿಶೇಷ ವರದಿ

ಗೋಡು: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಕೊಡಲು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಿದುಳು ಗೂ ಮಿದುಳಿನ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನಾ ಅಂಗವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಆದ ಕಾಗೆ, ಮಗು ಹುಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿಗೆ ೨ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಿದುಳಿನ ಸ್ಥಳವಾಯು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ದೇಹದಲ್ಲಿ ೨೨ ರಕ್ತಕಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ರೀತಿಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲಾಗಿ ಮಾಂಸಮಂಡಲಗಳ ಗಡುಸುತನ, ಕೊಡು, ಮಾಂಸಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆ, ಜಠರವ್ಯಕ್ತಿ ಚಲನೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಕೊಡುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಕಾಗಬೇ. ಕೃತಕ ಹಾಗೂ ಮಾಂಸಮಂಡಲ ವೈದ್ಯಕೀಕಾಗಬೇ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ರೋಗದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ೫-೨೨ ಮಂದಿಗೆ ಮಾಂಸಮಂಡಲ ವೈದ್ಯಕೀಕಾಗಬೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ೫-೨೦ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ರೋಗ, ೫-೨೫ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಮಂಡಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಗೂ ೫- ೨೨ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ: ಗರ್ಭಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ, ಅನೀಮಿಯಾ, ಈ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವುದು, ವೈದ್ಯಕೀಕಾಗಬೇ ಕೊಡು ಸರಿಯಾಗದ ಕೆಲವು ಇವನಿಂದ ಮೇಲೆ ಮಿದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಿದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮಿದುಳಿನ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.



ಮಿದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಮುನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮಗುವಿಗೆ ಮಾಂಸಮಂಡಲ ಅಗದ, ಕೆಲವೇ ದಿನದವ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಕಾಗಬೇಯಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಡಿಸ್ಟ್ರಿಬೂಷನ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯ.

|| ನಾ.ಸುರೇಶ್‌ರಾವ್ ಅರೋಗ್ಯ

ಜನನ ಪೂರ್ವ / ನಂತರದ ಜಾಗೃತಿ

ಶಿಶು ಜನನದ ಮೇಲೆ ಮಿದುಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯುಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯುಂಟಾದಲ್ಲಿ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ, ರುಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್ ನಂಥ ಸೋಂಕು, ಚಯಾಪಚಯ ಹಾಗೂ ಅನುವಂಶಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಮಿದುಳಿನ ಅಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಿರುದಿನ ಜನನ, ತಲೆ ಭಾಗದ ಗಾಯ ಮತ್ತಿತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಿದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಕುತ್ತಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ನಗುವುದನ್ನು ಕಲಿಯದಿರುವುದು, ಗುರುತಿಸದಿರುವುದು, ಗಾಣಿ ಮಾನ್ಯ ಇತರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಂಟಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿಗೆ ಹತ್ತು ವಾರಗಳಾದ ಬಳಿಕವೂ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದು. ೨ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹೊರಳದ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಅಸಹಜ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರು ಕೂಡಲೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.